

## HPV 9 疫苗 - 加衛苗 9 合 1 常見問題

### 1. 什麼是 HPV 9 疫苗 - 加衛苗 9 合 1?

加衛苗 9 合 1 (簡稱 HPV 9 疫苗) 是一種預防性疫苗，能預防由 9 種 HPV 病毒(人類乳頭瘤病毒) 感染引致的疾病如子宮頸癌、外陰癌、陰道癌、肛門癌、生殖器官濕疣(椰菜花)，覆蓋的 9 種 HPV 類型：HPV 6、11、16、18、31、33、45、52 及 58。

### 2. 誰人適合接種 HPV 9 疫苗 (加衛苗 9 合 1)?

現時本港註冊 HPV 9 價疫苗適合 9 歲或以上人士，必須經註冊醫生的評估後才可使用。

### 3. HPV 疫苗的成效如何？

HPV 疫苗的功效，對從未感染 HPV 的人士最為顯著。9 價 HPV 疫苗能預防由其覆蓋的 HPV 類型所引致的子宮頸癌、陰道癌、生殖器官濕疣，高達九成。

### 4. 懷孕中，我可否接種 HPV 9 疫苗？

不建議懷孕婦女接種 HPV 疫苗。

### 5. HPV 9 疫苗需要接種多少劑？

- 9 - 14 歲只需接種兩劑，在第一劑後 6 至 12 個月內需注射第二劑。
- 15 歲或以上人士須接種三劑，在完成第一劑後，兩個月後注射第二劑，再隔六個月注射第三劑。

### 6. HPV 疫苗有沒有副作用？

一般而言，HPV 疫苗是安全的。常見的副作用與其他疫苗相似，包括注射部位出現紅腫和疼痛、發燒、頭痛和作嘔。如對 HPV 疫苗的任何成分曾經產生過敏反應，建議有關人士不應接種此疫苗。如有疑問，請向你的家庭醫生查詢意見。

### 7. 接種 HPV 疫苗後，我仍需要接受子宮頸癌篩查嗎？

必定需要。接種 HPV 疫苗後，婦女仍需要進行子宮頸癌篩查，因為 HPV 疫苗不能清除已經帶有的 HPV 感染，亦不能預防 HPV 疫苗沒有包含的其他 HPV 類型病毒。

### 8. 誰不適宜接種 HPV 疫苗？

- 8 歲或以下
- 發燒
- 懷孕或餵哺母乳期間
- 對疫苗中任何成份有過敏反應
- 免疫系統問題或正服用藥物而影響免疫系統