

杜絕生蛇危機 以防劇痛煎熬

首選新一代
生蛇疫苗



防護效能不再受年齡規限*

於18個國家進行的臨床研究顯示，Shingrix保護效能超過90%²



50歲或以上人士效能
97.2%

70歲或以上人士效能
91.3%

亞洲數據¹⁵

於亞洲進行研究的數據顯示，
Shingrix的功效對50歲或以上的人士高達**95.6%**，
而70歲或以上亦達**94.7%**。




接種時間²



- 適合**50歲或以上**人士
- 適合**18歲或以上**高危人士
- 安全數據：**50歲或以上及18歲或以上**免疫力弱人士*的常見副作用包括：注射部位疼痛，肌肉疼痛，疲勞，發燒和頭痛，平均持續2-3天。

額外保護²



*免疫力弱人士接種兩劑疫苗所相隔的時間可以縮短至1-2個月

*免疫力弱人士安全數據包括實體腫瘤，腎臟移植，自體造血幹細胞移植，血癌及愛滋病

[†]併發症包括：帶狀皰疹相關血管炎、播散性疾病、眼科疾病、神經系統疾病、內臟疾病和中風

安全信息²：

- Shingrix預防帶狀皰疹和後遺神經痛，適用於50歲或以上的成人及18歲以上高風險人士。

- 已知對疫苗中的活性物質或任何成分過敏的患者及孕婦不應使用Shingrix。

- Shingrix僅適用於肌肉注射，最好的注射部位是三角肌。

- 常見的副作用包括注射部位疼痛，肌肉疼痛，疲勞，發燒和頭痛。